ฝักส้มป่อย

ชื่ออื่น ๆ ฝักส้มขอน ฝักเอกราช

ชื่ออังกฤษ Fructus Acacia Concinnae, Acacia Concinna Pod

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Acacia concinna* (Willd.) DC.

วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE)

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ กระจายพันธุ์ตามเขตร้อนในเอเชีย พบได้ทุกภาคของประเทศไทย

ส่วนที่ใช้ ฝักแก่แห้ง

สารสำคัญ สารกลุ่ม saponins (ประกอบด้วย acacinin C, D, E), สารกลุ่ม lactones

กลิ่น และรส กลิ่นคล้ายบ๊วย รสเปรี้ยว

1 เซนติเมตร

การใช้ตามภูมิปัญญา ตำราสรรพคุณยาไทย ใช้ต้มน้ำดื่ม หรือบดกินเป็นยาถ่ายเสมหะ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ไข้จับสั่น แก้น้ำลายเหนียว ทำให้อาเจียน ตำพอกหรือชุบสำลีปิดแผลโรคผิวหนัง ฝักใช้สระผม

บรรณานุกรม

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

http://www.worldfloraonline.org/

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558.

เอกสารนี้จัดทำโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน