กรุงเขมา

ชื่ออื่น ๆ รากขงเขมา รากหมาน้อย

ชื่ออังกฤษ Cissampelotis Pareirae Radix, Common Cissampelos Root, vetvetleaf root

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cissampelos pareira* L. var. *hirsuta* (Buch. ex DC.) Forman

วงศ์ MENISPERMACEAE

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ กระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย แอฟริกา และอเมริกา

0.5 เซนติเมตร

ส่วนที่ใช้ รากแห้ง

สารสำคัญ สารกลุ่ม alkaloids สารกลุ่ม saponins

กลิ่น และรส กลิ่นหอมเฉพาะ รสขม

การใช้ตามภูมิปัญญา สรรพคุณแก้ไข้ แก้ดีรั่ว ดีลัน น้ำดีซ่าน ใช้ปรุงเป็นยาดับพิษไข้ทุกชนิด ใช้ผสมเป็นยาอายุวัฒนะ

การศึกษาทางเภสัชวิทยา สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ลดความเป็นพิษต่อหัวใจของสาร isoproterenol ส่วนสารสกัดเอทานอล 50% ช่วยลดความเป็นพิษของ carbon tetrachloride ที่มีผลต่อตับ และมีฤทธิ์ต้านปวด ต้านอักเสบ

บรรณานุกรม

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

http://www.worldfloraonline.org/

กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 4. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

เอกสารนี้จัดทำโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน