ลูกสะบ้า

ชื่ออื่น ๆ สะบ้ามอญ สะบ้าหลวง สะบ้าใหญ่

ชื่ออังกฤษ Entadae Rheedii Semen, St. Thomas's Bean, Elephant Climber Bean,

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Entada rheedii* Spreng.

วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE)



1 เซนติเมตร

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ กระจายพันธุ์ในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชีย ในประเทศพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย และออสเตรเลีย

ส่วนที่ใช้ เนื้อในเมล็ดแห้ง

สารสำคัญ สารกลุ่ม triterpene saponins (ประกอบด้วย สาร rheediinoside A, B)

กลิ่น และรส กลิ่นเฉพาะ รสมัน

การใช้ตามภูมิปัญญา ตำราสรรพคุณยาไทย ใช้หุงกับน้ำมันใช้รักษาโรคผิวหนัง โรคหิด แก้เกลื้อน กลาก คุดทะราด สุมเป็นถ่าน ปรุงยาเป็นยาแก้พิษไข้ตัวร้อน แก้ไข้อันมีพิษจัดและเซื่องซึม

การศึกษาทางเภสัชวิทยา สารกลุ่ม triterpene saponins มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง และมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน

บรรณานุกรม

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

http://www.worldfloraonline.org/

กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 4. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

เอกสารนี้จัดทำโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน