เปลือกหว้า

ชื่ออังกฤษ Syzygii Cumini Cortex, Jambolan Bark

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Syzygium cumini* (L.) Skeells

วงศ์ MYRTACEAE

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์

กระจายพันธุ์ในประเทศไทยทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เนปาล ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เมียนมา ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย

1 เซนติเมตร

ส่วนที่ใช้ เปลือกต้นแห้ง

สารสำคัญ สารกลุ่ม C-glycoside of 4-O-methylgallic acids (ประกอบด้วย bergenin), สารกลุ่ม triterpenes (ประกอบด้วย betulinic acid, friedelin), สารกลุ่ม tannins (gallotannin, ellagitannin), สารกลุ่ม flavonoids

กลิ่น และรส กลิ่นเฉพาะ รสฝาด

การใช้ตามภูมิปัญญา ตำราสรรพคุณยาไทย ใช้แก้ท้องร่วง แก้บิด ชะล้างบาดแผลเน่าเปื่อย

การศึกษาทางเภสัชวิทยา มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ต้านเชื้อรา ต้านเชื้อไข้จับสั่น ต้านการอักเสบ ต้านการเกิดแผลเปื่อยกระเพาะ

บรรณานุกรม

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

http://www.worldfloraonline.org/

กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 4. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

เอกสารนี้จัดทำโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน