สมอทะเล

ชื่ออื่น ๆ ผลกระหุด ผลกือเราะ ผลกุระ ผลกุลา ผลคือรัก

ชื่ออังกฤษ Shirakiopsis Indicae Fructus

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Shirakiopsis indica* (Willd.) Esser

วงศ์ EUPHORBIACEAE

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ กระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางภาคกลางและภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ เมียนมา ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย

ส่วนที่ใช้ ผลแก่จัดและแห้ง

1 เซนติเมตร

สารสำคัญ สารกลุ่ม phorbol esters, สารกลุ่ม deoxyphorbol esters

กลิ่น และรส กลิ่นเฉพาะ รสเฝื่อนร้อน

การใช้ตามภูมิปัญญา ตำราสรรพคุณยาไทย ใช้ถ่ายลมเป็นพิษ เป็นยาระบาย แก้ธาตุพิการ แก้ช้างขโมย

การศึกษาทางเภสัชวิทยา สารกลุ่ม phorbol esters ทำให้ผิวหนังระคายเคือง ผิวหนังแดง และทำให้เกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

บรรณานุกรม

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

http://www.worldfloraonline.org/

กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 4. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

เอกสารนี้จัดทำโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน