ขี้กาแดง

ชื่ออื่น ๆ ขี้กาขม ขี้กาลาย ขี้กาใหญ่ มะตูมกา

ชื่ออังกฤษ Trichosanthis Tricuspidatae Fructus, rednall Snakegourd

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trichosanthes tricuspidata* Lour.

วงศ์ CUCURBITACEAE

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ กระจายทั่วทุกภาคในประเทศไทย ในต่างประเทศพบในอินเดีย ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

1 เซนติเมตร

ส่วนที่ใช้ ผลแก่แห้ง

สารสำคัญ สารกลุ่ม triterpenes glycosides (cucurbitacin J, K, R,)

กลิ่น และรส กลิ่นหอม รสขมมาก

การใช้ตามภูมิปัญญา สรรพคุณเป็นยาถ่ายอย่างแรง แก้ตานขโมย ขับพยาธิไส้เดือนในท้อง บำรุงน้ำดี แก้พิษเสมหะและโลหิต พิษตานซาง ใช้ควันรมแก้หืด

บรรณานุกรม

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

http://www.worldfloraonline.org/

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558.

เอกสารนี้จัดทำโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน